

# 1年を通じた病害虫防除

**ダエーブル 1000**  
散布適期 散布適期です!



赤文字 = 基幹防除  
黒文字 = 臨機防除  
青文字 = 地域により重要となる防除

## 害虫の標記

ウ ン カ → チャノミドリヒメヨコバイ	ホ ソ ガ → チャノホソガ
スリッス → チャノキロアザミウマ	ハ ダ ニ → カンザワハダニ
ハマキムシ → チャノカクモンハマキ・チャハマキ	サビダニ → チャノナガサビダニ
シャクトリムシ → ヨモギエダジャク他	クワシロ → クワシロカイガラムシ

## 三番茶を摘採する園

防除時期	一番茶			二番茶		三番茶		秋芽生育期		摘採・整枝	秋整枝後・越冬前
	一番茶萌芽前	一番茶萌芽期前後	摘採後	萌芽期～1葉期	摘採(整枝)直後	萌芽期～1葉期	摘採(整枝)直後	萌芽期～1葉期	3～4葉期		
主要病害	赤焼病			炭疽病 もち病 黒葉腐病 <small>散布適期</small>	輪斑病	炭疽病 黒葉腐病 <small>散布適期</small>	輪斑病	炭疽病 新梢枯死症 褐色円星病 網もち病・もち病	炭疽病・新梢枯死症 褐色円星病 網もち病・もち病	※1	
主要害虫	ハダニ チャトゲコナジラミ	ハダニ カメムシ アブラムシ	ハマキムシ ハダニ サビダニ チャトゲコナジラミ	ウンカ スリッス ホンガ		ウンカ スリッス ホンガ	ウンカ スリッス ハマキムシ	ウンカ スリッス ハマキムシ シャクトリムシ	ウンカ スリッス ハマキムシ ホソガ シャクトリムシ チャトゲコナジラミ	ハダニ	

※1 天候・発生状況に応じて炭疽病・もち病・網もち病  
ハマキムシ・シャクトリムシの追加防除。

## 一番茶後 中切り 更新園

スリップス  
ホンガ  
ウンカ  
クワシロ

再生芽は害虫の集中被害を受けやすく、樹勢回復、翌年以降の収量や品質に影響します。

だから

更新園の病害虫防除も重要です!

リハハム病菌  
たへえ病菌

新梢枯死症や炭疽病、整枝後に輪斑病が発生します。

## 二番茶後 深刈り 更新園

防除時期	更新後	再生芽の萌芽期～1葉期	3～4葉期	摘採(整枝)直後
主要病害	更新	新梢枯死症	炭疽病・新梢枯死症 <small>散布適期</small>	輪斑病
主要害虫	クワシロ	ウンカ スリッス ホンガ	ウンカ スリッス ホンガ	ハダニ

※2 天候・発生状況に応じて炭疽病・新梢枯死症・ウンカ・スリッス・ホンガの追加防除。(摘採(収穫)する場合は農薬の使用基準に注意。)

秋芽生育期の防除は  
上記に同じ



防除時期	更新後	再生芽の萌芽期～1葉期	3～4葉期	摘採(整枝)直後
主要病害	更新	新梢枯死症	炭疽病・新梢枯死症 <small>散布適期</small>	輪斑病
主要害虫	クワシロ	ウンカ スリッス ホンガ	ウンカ スリッス ホンガ	ハダニ

秋芽生育期の防除は  
上記に同じ

クワシロカイガラムシ

ふ化最盛期防除  
(5月・7月・9月)も重要!

※ 越冬成虫休眠期防除  
できる薬剤もあります。