

# 茶期ごとの病害虫防除

**サユール 1000**  
散布適期 散布適期です！



## 害虫の標記

赤文字 = 基幹防除	ウ ン カ → チャノミドリヒメヨコバイ	ホ ソ ガ → チャノホンガ
黒文字 = 臨機防除	ス リ ッ プ ス → チャノキイロアザミウマ	ハ ダ ニ → カンザワハダニ
青文字 = 地域により重要となる防除	ハ マ キ ム シ → チャノコカクモンハマキ・チャハマキ	サ ビ ダ ニ → チャノナガサビダニ
	シャクトリムシ → ヨモギエダシヤク他	ク ワ シ ロ → クワシロカイガラムシ

## 三番茶を摘採しない園

防除時期	一番茶 萌芽前	一番茶 萌芽期前後	摘採後	二番茶 萌芽期~1葉期	摘採(整枝)直後	三番茶 萌芽期~1葉期	3~4葉期	出開~成葉硬化期	秋芽生育期 萌芽期~1葉期	秋整枝後・越冬前
主要病害	赤焼病			炭疽病 もち病 黒葉腐病	輪斑病	炭疽病・新梢枯死症 褐色円星病 網もち病・もち病	炭疽病・新梢枯死症 褐色円星病 網もち病・もち病	炭疽病 褐色円星病	炭疽病 褐色円星病 網もち病・もち病	炭疽病 褐色円星病 網もち病・もち病
主要害虫	ハダニ チャトゲコナジラミ	ハダニ カメムシ アブラムシ	ハマキムシ ハダニ サビダニ	ウンカ スリップス ホンガ チャトゲコナジラミ		ウンカ スリップス ハマキムシ ホンガ シャクトリムシ	ウンカ スリップス ハマキムシ ホンガ シャクトリムシ		ウンカ スリップス ハマキムシ ホンガ シャクトリムシ	ハダニ

## 一番茶後 中切り 更新園

防除時期	更新後	再生芽の萌芽期~1葉期	3~4葉期	摘採(整枝)直後
主要病害		新梢枯死症	炭疽病・新梢枯死症	輪斑病
主要害虫	クワシロ	ウンカ スリップス ホンガ	ウンカ スリップス ホンガ	ハダニ

再生芽は害虫の集中被害を受けやすく、樹勢回復、翌年以降の収量や品質に影響します。

だから



新梢枯死症や炭疽病、整枝後に輪斑病が発生します。

## 二番茶後 深刈り 更新園

防除時期	更新後	再生芽の萌芽期~1葉期	3~4葉期	摘採(整枝)直後
主要病害		新梢枯死症	炭疽病・新梢枯死症	輪斑病
主要害虫	クワシロ	ウンカ スリップス ホンガ	ウンカ スリップス ホンガ	ハダニ

秋芽生育期の防除は上記に同じ



クワシロカイガラムシ  
ふ化最盛期防除(5月・7月・9月)も重要!

※越冬成虫休眠期防除できる薬剤もあります。

更新園の病害虫防除も重要です!